

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

| DISERBO ORTICOLE Radicchio 2025 v1 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Epoca | Infestante | Sostanza attiva | Num. max inter. con i c.a.s | Note sostanza attiva - vincoli | Note sostanza attiva - consigli | Note epoca | Vincoli coltura | Consigli coltura | Informazioni aggiuntive |
| Pre semina o pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Acido pelargonico | <p>2</p> <p>Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi</p> | | | | | | |
| Pre trapianto, pre semina, post trapianto, post semina | Graminacee e Dicotiledoni | Propyzamide | | | | | | | |
| Pre trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Pendimethalin | | | | | | | |
| | | Bifenox | | | | | | | |
| Post emergenza | Graminacee | Ciclossidim | | | | | | | |
| | | Quizalofop-p-etile | | | Verificare autorizzazione formulati commerciali | | | | |
| | | Fluazifop-p-butile | | | | | | | |
| Post emergenza diserbo interfila | Graminacee e Dicotiledoni | Acido pelargonico | | <p>Applicare su infestanti in attiva crescita fino allo stadio di 8-10 foglie e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm.</p> <p>Distribuire con attrezzature protettive per evitare il contatto con le colture</p> | | | | | |