


PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

RICHIEDENTE: ISA srl

RELAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCO LUDICO
PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE DELL'ATTRATTIVITA' TURISTICA
IN LOC. LA CONTESSA SUL MONTE AMIATA



Indice

| | |
|---|----|
| 1 – Premessa..... | 3 |
| 2 – Quadro normativo di riferimento..... | 4 |
| 3 - Descrizione dell'area protetta "Cono vulcanico del Monte Amiata" | 9 |
| 3.1 - Vegetazione e flora..... | 9 |
| 3.2 - Gli habitat | 15 |
| 3.3 - La flora..... | 16 |
| 3.4 - La fauna | 18 |
| 3.5 - Principali elementi di criticità del sito | 19 |
| 3.6 - Principali misure di conservazione | 24 |
| 3.7 – Caratteristiche ZSC "Cono vulcanico del Monte Amiata" - Supplemento al Bollettino | 25 |
| 4 - Interventi agroforestali per cui è richiesto lo Studio di Incidenza Ambientale..... | 27 |
| 4.1 - 117 IT51A0017 Cono vulcanico del Monte Amiata | 27 |
| 5. Misure di conservazione..... | 28 |
| 5.1 - Cono vulcanico del Monte Amiata - Misure di conservazione della ZSC (Supplemento n. 179 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015 / 1223-15) | 28 |
| 6 - Descrizione dell'area e degli interventi | 31 |
| 7 – Finalità ed obiettivi | 33 |

1 – Premessa

Il presente documento è redatto per la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di parco ludico per la destagionalizzazione dell'attrattività turistica in Loc. "La Contessa" consistente nell'apposizione di alcune opere idonee allo scopo prefissato.

Tale intervento si rende necessario per migliorare l'offerta turistica dell'area amiatina anche nel periodo estivo, cercando di discostarsi dalla sola offerta legata agli impianti sciistici nel periodo invernale.

Sulla base delle varie misure di conservazione dei siti protetti, anche in relazione ai vari habitat interessati dagli interventi, verrà redatto il presente Studio di Incidenza Ambientale, il quale avrà l'obiettivo principale di prendere in considerazione tutte le incidenze negative o positive che arrecheranno degli effetti agli habitat e specie di notevole interesse.

2 – Quadro normativo di riferimento

Normativa comunitaria:

- *Dir. 21-4-2004 n. 2004/35/CE* - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Publicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L. 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.

- *Dec. 22-7-2002 n. 1600/2002/CE* - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente.

Publicata nella G.U.C.E. 10 settembre 2002, n. L. 242.

- *Dir. 29-3-1999 n. 1999/22/CE* - Direttiva del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

Publicata nella G.U.C.E. 9 aprile 1999, n. L. 94. Entrata in vigore il 9 aprile 1999.

- *Dec. 22-10-1999 n. 1999/800/CE* - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona).

Publicata nella G.U.C.E. 14 dicembre 1999, n. L. 322.

- *Dec. 18-12-1996 n. 97/266/CE* - Decisione della Commissione concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000.

Publicata nella G.U.C.E. 24 aprile 1997, n. L. 107.

- *Dir. 21-5-1992 n. 92/43/CEE* - Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Publicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L. 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

- *Dec. 1-3-1984 n. 84/132/CEE* - Decisione del Consiglio concernente la conclusione del Protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo.

Publicata nella G.U.C.E. 10 marzo 1984, n. L. 68.

Normativa statale:

- Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e successive modificazioni e integrazioni.

- Legge 14 febbraio 1994, n. 124 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE; (RECEPIMENTO DIR.VA HABITAT)

- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

- Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

- DPR 12 marzo 2003 n.120 (MODIFICA DELLA 357/97)

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" (RECEPIMENTO DELLA DIR.VA UCCELLI)

- Decreto Ministeriale (MATTM) 24 maggio 2016 “designazione di 17 zone di conservazione speciale ZSC continentali e 72 mediterranei in Toscana”.
- Decreto Ministeriale (MATTM) 22 dicembre 2016 “Designazione di 16 zone di conservazione speciale (ZSC) continentali e 29 ZSC della regione mediterranea in Toscana”.

Normativa regionale:

- Del.C.R. 10 novembre 1998, n.342 “Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria “Habitat”. (INVENZIONE DEI SIR).
- Del. G.R. 23 novembre 1998, n. 1437 “Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette”.
- L.R. 6 aprile 2000, n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio”.
- Del.GR 5 luglio 2004, n.644 – “attuazione art.12 comma1 lett.a della LRT 56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR”.
- Del. GR 21 gennaio 2004, n.6 - “Perimetrazione dei SIR e designazione di ZPS in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE”.
- Del GR 16 giugno 2008 n.454 -” D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione.”
- Del. GR 28 ottobre 2011 n.916 “definizione dei criteri per l’applicazione della Valutazione di Incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore”
- Legge 30 del 19 marzo 2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”
- Del. GR 15 dicembre 2015 n.1223 “Direttiva 92/43/CE Habitat art.4 e 6 Approvazione delle misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione come ZSC.
- Del. GR 19 dicembre 2016 n.1319 “L.30/2015 Modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli art. 123 e 123 bis ed approvazione dell’elenco di attività, progetti ed interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.
- Del. GR 12.02.2018 n.119 “L.30/2015 Modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli art. 123 e 123 bis ed approvazione dell’elenco di attività, progetti ed interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana. (allegati A, B, C)

LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER LIVELLI

La valutazione d'incidenza è disciplinata, a livello nazionale, dal D.P.R. 08.09.1997 n. 357, così come modificato dal D.P.R. 12.03.2003 n. 120, in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La Regione Toscana all'art. 1 della L. R. 06.04.2000 n. 56 "riconosce e tutela le biodiversità in attuazione del DPR 8 settembre 1997 n. 357 (...) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici...". Le norme tecniche di attuazione della L.R. 56/2000, approvate con D.G.R. 05.07.2004, n. 644, disciplinano le modalità di tutela e di conservazione dei SIR, individuano i principali obiettivi di conservazione per ciascun SIR e indicano le principali misure di conservazione. Per la stesura della presente relazione sono stati presi a riferimento: il documento pubblicato dalla Commissione Europea nel 2002, LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 – Guida all'interpretazione dell'art. 6, della direttiva habitat 92/43/CEE; il documento pubblicato dalla Commissione Europea nel 2002, VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI AVENTI UN'INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE, e il documento di orientamento sull'art. 6, paragrafo 4 direttiva Habitat 92/43/CEE, - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE, pubblicato nel Gennaio 2007. Il ricorso a tali documenti appare opportuno in quanto la L.R. 56/2000 ha di fatto esteso a tutti i SIR le disposizioni previste per i siti della rete Natura 2000.

Tali livelli d'indagine sono concepiti in modo consequenziale, in quanto a ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione Europea – D.G. Ambiente nel Novembre 2001 -, è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

1° Livello: SCREENING

Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

2° Livello: VALUTAZIONE APPROPRIATA

Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

3° Livello: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

4° Livello: VALUTAZIONE IN CASO DI ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA

Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

Tali passaggi ai livelli successivi d'indagine possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti casi:

- l'indagine può limitarsi al livello I (screening): non sono stati rilevati effetti significativi sui SIR;
- l'indagine può limitarsi al Livello II (valutazione appropriata): non sono stati rilevati effetti in grado di pregiudicare l'integrità del SIR;
- l'indagine può limitarsi al Livello III (valutazione delle soluzioni alternative): sono stati rilevati effetti in grado di pregiudicare l'integrità del SIR;
- l'indagine deve estendersi al Livello IV (valutazione delle misure compensative): non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l'integrità del SIR; occorre verificare se esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale dei SIR.

La fase di screening, corrispondente al livello I, si concretizza nel processo di individuazione delle implicazioni potenziali, in termini di incidenza, di piani o progetti, considerati sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, sull'area protetta, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Al termine di questa fase, se, in base alle informazioni fornite, vi è la probabilità che si producano effetti significativi, ovvero permane un margine di incertezza, è necessario procedere alla valutazione appropriata, corrispondente al livello II. Questa fase consiste nella valutazione dell'incidenza del progetto/piano sull'integrità dell'area protetta, in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e in relazione alla sua struttura e funzione. L'integrità di un sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno essere effetti negativi, occorre concentrarsi e limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito. A seguito del completamento della valutazione appropriata, se si ritiene che permangono alcuni effetti negativi capaci di incidere sull'integrità dell'area protetta, nonostante le misure di mitigazione, il progetto/piano non può procedere fino a che non sarà ultimata la valutazione del terzo livello e fino a che non si giungerà alla conclusione oggettiva che non vi sono soluzioni alternative. Il livello successivo, infatti, è rivolto alla valutazione delle soluzioni alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dell'area protetta. Questo livello prevede l'esame di modi alternativi di attuare il progetto/piano per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del sito. Rispetto a questo livello, altri parametri di valutazione, come i criteri economici, non possono essere considerati predominanti su quelli ecologici. L'esame di soluzioni alternative richiede che prevalgano gli obiettivi di conservazione e lo status dell'area protetta su ogni altra

considerazione di costi, ritardi o altri aspetti che attengono alle soluzioni alternative. Qualora siano state individuate soluzioni alternative che possono scongiurare l'incidenza negativa o che possono attenuare gli effetti sul sito, è necessario valutarne l'impatto ricominciando dal livello I o II a seconda del caso. Tuttavia, se si può ragionevolmente o oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative, sarà necessario procedere al livello IV previsto dalla presente metodologia di valutazione. Per procedere devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni: la scelta proposta e da approvare, è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità dell'area protetta, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentano incidenze negative sull'integrità del sito; sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi "motivi di natura sociale o economica". Tali motivi si riferiscono a situazioni, dove i piani o progetti previsti sono indispensabili come nel caso di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente) o nel contesto di politiche fondamentali per lo stato e la società o nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico. Il livello IV si configura quindi come una valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. Dopo individuazione e valutazione delle misure compensative e dai risultati ottenuti è possibile desumere se le misure compensative possono avere sito positivo nel mantenere o intensificare la coerenza globale della rete Natura 2000. A tal fine bisogna garantire che il sito rimanga allo stesso titolare, che siano elaborati piani di gestione con obiettivi chiari e conseguibili a breve, medio e lungo termine e che siano attuati meccanismi di monitoraggio a lungo termine. Il monitoraggio è particolarmente importante, poiché garantisce che siano conseguiti gli obiettivi di conservazione di Natura 2000.

3 - Descrizione dell'area protetta “Cono vulcanico del Monte Amiata”

La ZSC “*Cono vulcanico del Monte Amiata*” comprende l'intero rilievo del Monte Amiata (1.733 m s.l.m.) e i rilievi minori circostanti, situati a cavallo tra le province di Siena (Comuni di Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia) e Grosseto (Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, S. Fiora, Seggiano), nella quale ricade oltre la metà del sito.

I confini del sito coincidono in parte con la viabilità che corre ai piedi del rilievo, all'altezza, per quanto riguarda la parte senese, dei paesi di Vivo d'Orcia e Abbadia S. Salvatore. Verso sud il sito è pressoché in contiguità con altri siti Natura 2000 e aree protette che interessano i rilievi montani di questa parte della Toscana, formando con essi un comprensorio di alto valore naturalistico: in Provincia di Siena la ZSC “*Foreste del Siele e Pigelleto di Piancastagnaio*” e in Provincia di Grosseto la ZSC/ZPS “*Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna*”, la ZSC/ZPS “*Alto Corso del fiume Fiora*” e la ZSC “*Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella*”.

3.1 - Vegetazione e flora

| CLC | 1° liv | 2° liv | 3° liv | 4° liv | 5° liv | Area (ha) | % |
|-------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|-----------|-------|
| 1111 | Territori modellati artificialmente | Zone urbanizzate | Zone residenziali a tessuto continuo | Tessuto urbano | - | 0.84 | 0.05% |
| 1113 | Territori modellati artificialmente | Zone urbanizzate | Zone residenziali a tessuto continuo | Aree verdi urbane | - | 0.54 | 0.03% |
| 1121 | Territori modellati artificialmente | Zone urbanizzate | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado | Case sparse | - | 1.68 | 0.09% |
| 1124 | Territori modellati artificialmente | Zone urbanizzate | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado | Pertinenze verdi delle abitazioni | - | 9.66 | 0.55% |
| 1126 | Territori modellati artificialmente | Zone urbanizzate | Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado | Ruderi | - | 0.03 | 0.00% |
| 121 | Territori modellati artificialmente | Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione | Aree industriali o commerciali | - | - | 0.85 | 0.05% |
| 12223 | Territori modellati artificialmente | Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione | Reti stradali e ferroviarie | Viabilità stradale e sue pertinenze | Altre strade asfaltate | 10.63 | 0.60% |
| 12224 | Territori modellati artificialmente | Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione | Reti stradali e ferroviarie | Viabilità stradale e sue pertinenze | Altre strade a fondo sterrato | 5.20 | 0.29% |
| 12225 | Territori modellati artificialmente | Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione | Reti stradali e ferroviarie | Viabilità stradale e sue pertinenze | Stazioni di servizio, piazzole, imposti | 1.04 | 0.06% |
| 142 | Territori modellati artificialmente | Zone verdi artificiali non agricole | Aree sportive e ricreative | - | - | 6.85 | 0.39% |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--------|---------|
| 21121 | Territori agricoli | Seminativi | Seminativi in aree non irrigue | Colture estensive | Seminativi semplici - Terreni soggetti alla coltivazione erbacea estensiva di cereali, leguminose e colture orticole in campo | 7.85 | 0.44% |
| 242 | Territori agricoli | Zone agricole eterogenee | Sistemi colturali e particellari complessi | - | - | 0.30 | 0.02% |
| 31125 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di latifoglie | Boschi di querce caducifoglie | Cerrete acidofile montane. Bosco a prevalenza di cerro, con carpino nero, castagno e faggio, fertilità discreta, su suoli silicei e acidificati. | 35.20 | 1.99% |
| 3114 | Territori boscati e ambienti | Zone boscate | Boschi di latifoglie | Boschi di castagno | - | 458.67 | 25.95 % |
| 3115 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di latifoglie | Boschi di faggio | - | 885.18 | 50.09 % |
| 31163 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di latifoglie | Boschi di specie igrofile | Pioppo-olmeti ripariali - Formazioni di pioppo bianco, pioppo nero, con olmo campestre, ontano nero e salici | 1.19 | 0.07% |
| 31167 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di latifoglie | Boschi di specie igrofile | Impianti di ontano | 1.29 | 0.07% |
| 3123 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di conifere | Boschi di abete bianco e rosso | - | 118.78 | 6.72% |
| 31231 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di conifere | Boschi di abete bianco e rosso | Rimboschimenti di abete bianco | 14.40 | 0.82% |
| 31232 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di conifere | Boschi di abete bianco e rosso | Rimboschimenti di abete rosso | 1.03 | 0.06% |
| 31252 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di conifere | Boschi di conifere esotiche | Rimboschimenti di douglasia o cedri | 0.80 | 0.04% |
| 3127 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone boscate | Boschi di conifere | Rimboschimenti di conifere varie (Abies alba, Picea abies, Douglasia, Pinus nigra ecc..) | - | 53.25 | 3.01% |
| 3214 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Prati-pascoli naturali e praterie | Praterie mesofile | - | 21.41 | 1.21% |
| 3215 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Prati-pascoli naturali e praterie | Prati umidi | - | 0.18 | 0.01% |
| 32222 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Brughiere e cespuglieti | Arbusteti termofili | Pruneti - Arbusteti decidui termofili con pruno (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), pero mandorlino (Pyrus amygdaliformis) | 19.77 | 1.12% |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|--|-------------|----------------|
| 32231 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Brughiere e cespuglieti | Arbusteti xerofili | Ginestreti - Arbusteti a netta prevalenza di ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i>) con altre specie dei pruneti | 0.65 | 0.04% |
| 3224 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o | Brughiere e cespuglieti | Roveti | - | 0.04 | 0.00% |
| 3225 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Brughiere e cespuglieti | Pteridioto | - | 1.16 | 0.07% |
| 3243 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea | Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione | Misto arbusteti e lembi di querceto - Aree in evoluzione | | 7.94 | 0.45% |
| 332 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone aperte con vegetazione rada o assente | Rocce nude, falesie, rupi, ghiaioni, affioramenti | - | - | 1.35 | 0.08% |
| 3335 | Territori boscati e ambienti seminaturali | Zone aperte con vegetazione rada o assente | Aree con vegetazione rada | Cesse parafuoco, aree verdi o nude di pertinenza di reti infrastrutturali | - | 2.93 | 0.17% |
| 5122 | Corpi idrici | Acque continentali | Bacini d'acqua | Laghi artificiali | - | 0.05 | 0.00% |
| Totale | | | | | | 1789 | 100.00% |

Tab. 1 - Tipologie di uso del suolo identificate nel SIC "Cono vulcanico del Monte Amiata" nel sistema Corine Land Cover (CLC). Sono riportati i codici Corine e le decodifiche dei diversi livelli: 1° liv: Decodifica Corine 1° Livello; 2° liv: Decodifica Corine 2° Livello; 3° liv: Decodifica Corine 3° Livello; 4° liv: Decodifica Corine 4° Livello; 5° liv: Decodifica Corine 5° Livello; viene riportata la superficie occupata all'interno del sito dalle singole categorie CORINE (in ettari) e la relativa percentuale rispetto alla superficie del sito

Per quanto riguarda le tipologie vegetazionali rilevabili dall'analisi dell'uso del suolo, queste sono così inquadrabili e sintetizzabili:

| TIPOLOGIA USO DEL SUOLO | CODICE | DESCRIZIONE |
|--|-----------|--|
| Seminativi semplici – Colture Estensive | CLC 21121 | Questa tipologia comprende coltivazioni a seminativo non irrigue in cui prevale la coltivazione erbacea estensiva di cereali, leguminose e colture orticole in campo. Si tratta di aree agricole tradizionali a basso impatto e quindi con una flora compagna spesso a rischio. Si possono riferire qui anche i sistemi molto frammentati con piccoli lembi di siepi, boschetti, prati stabili. Tuttavia, anche queste coltivazioni rischiano l'estrema semplificazione degli agro-ecosistemi. Questa tipologia è distribuita nella ZSC, in patch più o meno estese. |
| Sistemi colturali e particellari complessi | CLC 242 | In questa tipologia sono inclusi i sistemi di orti e piccoli seminativi e serre a servizio delle abitazioni. |
| Bosco a prevalenza di cerro | CLC 31127 | Questa tipologia comprende boschi dominati da <i>Quercus cerris</i> che si sviluppano su substrati acidi. Sono ben diffuse nell'Italia. Tra le specie guida si possono identificare: <i>Quercus cerris</i> (dominante), <i>Acer opalus subsp. obtusatum</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus pubescens</i> , |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p><i>Quercus petraea</i> (codominanti), <i>Asparagus tenuifolius</i>, <i>Crataegus laevigata</i>, <i>Sorbus aria</i>, <i>Brachypodium sylvaticum</i>, <i>Carex sylvatica</i>, <i>Cornus mas</i>, <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Ligustrum vulgare</i>, <i>Lonicera caprifolium</i>, <i>Melica uniflora</i>, <i>Prunus spinosa</i>, <i>Ruscus aculeatus</i>, <i>Rosa sempervirens</i>, <i>Viola alba</i> (altre specie significative). Nelle cerrete che costeggiano il Fosso Vessola, presso il Vivo d'Orcia, la composizione è arricchita dalla presenza del faggio con esemplari di notevoli dimensioni (Piazzini, com. pers.). Questa tipologia, caratterizzata da un governo ceduo, è distribuita nella parte settentrionale della ZSC.</p> |
| Boschi di castagno | CLC 3114 | <p>In questa categoria sono inclusi sia i veri boschi con castagno sia i castagneti da frutto non gestiti in modo intensivo. Essi vanno a sostituire numerose tipologie forestali, in particolar modo querceti e carpineti. La specie dominante è <i>Castanea sativa</i> e negli aspetti non più gestiti i castagneti si arricchiscono di specie dei <i>Quercetalia pubescentis</i> e dei <i>Fagetalia</i>, in relazione al piano altitudinale e alle condizioni climatiche. Questa tipologia è identificabile con l'habitat 9260, poiché esso include i boschi misti con abbondante castagno e i castagneti d'impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni.</p> |
| Boschi di faggio | CLC 3115 | <p>Questa tipologia comprende le faggete termofile con presenza di tasso e agrifoglio nello strato alto- arbustivo e arbustivo del piano bioclimatico supratemperato, e con ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei, sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica. Queste faggete sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (<i>Geranio striati-Fagion</i>). Alcune specie ben rappresentate, oltre a <i>Fagus sylvatica</i>, <i>Ilex aquifolium</i> e <i>Taxus baccata</i>, sono: <i>Abies alba</i>, <i>Acer platanoides</i>, <i>A. pseudoplatanus</i>, <i>Anemone apennina</i>, <i>A. nemorosa</i>, <i>A. ranunculoides</i>, <i>Aremonia agrimonoides</i>, <i>Cardamine bulbifera</i>, <i>C. kitaibelii</i>, <i>C. chelidonia</i>, <i>Cephalanthera damasonium</i>, <i>Corydalis cava</i>, <i>C. solida</i>, <i>C. pumila</i>, <i>Daphne mezereum</i>, <i>Euphorbia amygdaloides</i>, <i>Galanthus nivalis</i>, <i>Galium odoratum</i>, <i>Lathyrus venetus</i>, <i>L. vernus</i>, <i>Melica uniflora</i>, <i>Mycelis muralis</i>, <i>Polystichum aculeatum</i>, <i>Potentilla micrantha</i>, <i>Ranunculus lanuginosus</i>, <i>Rubus hirtus</i>, <i>Sanicula europaea</i>, <i>Scilla bifolia</i>, <i>Viola reichembachiana</i>, <i>V. riviniana</i>, <i>V. odorata</i>, <i>Athyrium filix-femina</i>, <i>Dryopteris filix-mas</i>, <i>Convallaria majalis</i>, <i>Gagea lutea</i>, <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Paris quadrifolia</i>, <i>Rumex arifolius</i>, <i>Polygonatum multiflorum</i>, <i>Ruscus hypoglossum</i>, <i>Epipactis helleborine</i>, <i>E. microphylla</i>, <i>Neottia nidus-avis</i>, <i>Cephalanthera longifolia</i>, <i>C. rubra</i> e <i>Aquilegia vulgaris</i>.</p> <p>Le faggete sono ampiamente distribuite in tutta la ZSC e sono attribuibili, secondo il Manuale, all'habitat 9210.</p> |
| Pioppo-olmeti ripariali - Formazioni di pioppo bianco, pioppo nero, con olmo campestre, | CLC 31163 | <p>Foreste alluvionali multi-stratificate dell'area mediterranea. Sono caratterizzate da <i>Populus alba</i>, <i>Ulmus minor</i>, <i>Salix alba</i>, <i>Alnus glutinosa</i>. Alla copertura arborea si associa una densa copertura arbustiva. Questa tipologia è distribuita nella parte settentrionale del SIC, nelle vicinanze del Vivo d'Orcia, lungo i torrenti e fossi, tra cui il Fosso Scudellino ed è attribuibile, secondo il Manuale, all'habitat 92A0.</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| ontano nero e salici | | |
| Impianti di ontano | CLC 31167 | Questa tipologia è caratterizzata da impianti artificiali di boschi di specie igrofile, in particolare <i>Alnus cordata</i> . È presente un'unica piccola area nei pressi di Abbadia San Salvatore. |
| Rimboschimenti di pino nero. Formazioni pure di pino nero derivate da rimboschimenti su suoli degradati nella fascia dei boschi a latifoglie mesofile | CLC 31221 | Questa tipologia comprende gli impianti di <i>Pinus nigra</i> , copre circa il 5% del sito ed è costituita quasi interamente da rimboschimenti con pino nero e da aree conquistate successivamente in modo spontaneo dal pino, che ha facilmente trovato attecchito nei cedui impoveriti e radi e nei castagneti attaccati da fitopatologie. Attualmente le pinete si rinvengono principalmente la parte settentrionale della ZSC. |
| Boschi di abete bianco e rosso | CLC 3123 | Questa tipologia comprende rimboschimenti di conifere effettuate all'interno o al margine dell'areale della specie stessa. In molti casi risulta difficile distinguere le formazioni naturali, ma gestite dall'uomo, da quelle secondarie o dagli impianti. Il problema interpretativo si presenta al margine degli areali. |
| Rimboschimenti di abete bianco | CLC 31231 | Questa tipologia comprende rimboschimenti artificiali di abete bianco e boschi di conifere indigene in cui sono presenti <i>Abies alba</i> (dominante), <i>Larix decidua</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Pinus sylvestris</i> (codominanti), <i>Melampyrum sylvaticum</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer opalus subsp. obtusatum</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Luzula nivea</i> , <i>Oxalis acetosella</i> , <i>Polygonatum verticillatum</i> , ecc... |
| Rimboschimenti di abete rosso | CLC 31232 | - |
| Rimboschimenti di douglasia o cedri | CLC 31252 | - |
| Rimboschimenti di conifere varie (<i>Abies alba</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Douglasia</i> , <i>Pinus nigra</i> ecc.) | CLC 3127 | Queste tipologie comprendono ambienti gestiti e le piantagioni sono rappresentate da conifere autoctone ed esotiche, in cui il disturbo antropico è piuttosto evidente. Spesso il sottobosco è quasi assente. |
| Praterie mesofile | CLC 3114 | Questa tipologia comprende tutti i prati stabili con concimazioni (ed eventuali irrigazioni) non troppo intense che permettono una certa biodiversità al loro interno. Sono dominati da <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Poa pratensis</i> e <i>Centaurea nigrescens</i> . Questa tipologia può essere attribuita all'habitat 6510. |
| Prati umidi | CLC 3215 | Questa tipologia è rappresentata da formazioni prative dominate da <i>Molinia caerulea</i> che si instaurano su suoli a buona disponibilità idrica. Sono presenti in tutta l'Italia settentrionale e nelle fasce superiori di quella peninsulare. Sono associazioni secondarie create dall'uomo per disboscio di boschi umidi e sono ridotte a pochi lembi e spesso cespugliate. Nel SIC è stata individuata su suoli minerali a reazione acida, presso il Pian della Piscina, lungo la S.P. Vetta dell'Amiata. Questa tipologia può essere attribuita agli habitat 3130 e 6410 per la presenza di suoli torbosi o argillo-limosi, a umidità costante o anche con significative variazioni stagionali. |
| Pruneti - Arbusteti | CLC 32222 | In questa tipologia rientrano i cespuglieti a caducifoglie, sia dei suoli ricchi che dei suoli più superficiali della fascia collinare-montana delle |

| | | |
|---|-----------|--|
| decidui termofili con pruno (<i>Prunus spinosa</i>), biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>), pero mandorlino (<i>Pyrus amygdaliformis</i>) | | latifoglie caducifoglie (querce, carpini, faggio, frassini, aceri). Queste formazioni, in origine mantelli dei boschi, sono oggi diffuse quali stadi di incespugliamento su pascoli abbandonati e in alcuni casi costituiscono anche siepi. Le formazioni arbustive di questa tipologia sono a dominanza di <i>Prunus spinosa</i> e <i>Ulmus minor</i> si ritrovano in ambienti in evoluzione o ai margini dei campi. In situazioni meno mature le specie suddette sono sostituite da popolazioni di <i>Spartium junceum</i> (Chiarucci et al., 1995a). |
| Ginestreti - Arbusteti a netta prevalenza di ginestra odorosa (<i>Spartium junceum</i>) con altre specie dei pruneti | CLC 32231 | Questa tipologia include formazioni a <i>Spartium junceum</i> e dell'alleanza <i>Cytision</i> in cui dominano vari arbusti dei generi <i>Cytisus</i> , <i>Genista</i> , <i>Calicotome</i> , fra cui <i>Cytisus sessifolius</i> e <i>Cytisus scoparius</i> . Le formazioni a <i>Spartium junceum</i> sono evolutivamente legate al <i>Cytision</i> . Spesso si tratta di stadi di ricolonizzazione di pascoli abbandonati. |
| Roveti | CLC 3224 | Questa tipologia comprende formazioni submediterranee dominate da rosaceae sarmentose e arbustive accompagnate da un significativo contingente di lianose. Sono aspetti di degradazione o incespugliamento legati a leccete, ostrieti, querceti e carpineti termofili. Tra le specie guida di questa tipologia è possibile identificare <i>Rubus sp.</i> , <i>Cornus mas</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Paliurus spina-christi</i> (dominanti), <i>Clematis vitalba</i> , <i>Rosa arvensis</i> , <i>Rosa micrantha</i> , <i>Rosa sempervirens</i> , <i>Rubia peregrina</i> , <i>Spartium junceum</i> , <i>Smilax aspera</i> , <i>Tamus communis</i> , <i>Ulmus minor</i> . |
| Pteridieto | CLC 3225 | Questa tipologia comprende le ricolonizzazioni di alcuni pascoli mesofili, ben diffusi su substrati acidificati, in cui <i>Pteridium aquilinum</i> forma delle popolazioni molto compatte. |
| Misto arbusteti e lembi di querceto - Aree in evoluzione | CLC 3243 | In questa tipologia rientrano i cespuglieti a caducifoglie in uno stato molto avanzato di evoluzione, ai limiti della formazione boschiva. Queste formazioni sono oggi diffuse quali stadi di incespugliamento su pascoli abbandonati da tempo e siepi annose. Le formazioni arbustive di questa tipologia sono a dominanza di <i>Prunus spinosa</i> e <i>Ulmus minor</i> e vi si rinvencono piante del genere <i>Quercus</i> . |
| Rocce nude, falesie, rupi, ghiaioni, affioramenti | CLC 332 | Questa tipologia è rappresentata da formazioni derivate da rocce acide del piano montano e subalpino a granulometria e stabilità del substrato variabili. Sono qui riferiti i ghiaioni stabilizzati con poco humus. |
| Cesse parafuoco, aree verdi o nude di pertinenza di reti infrastrutturali | CLC 3335 | Questa tipologia comprende aree con vegetazione rada, che viene tagliata frequentemente e le specie prevalenti sono quelle a rapida crescita, come <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Rubus sp.</i> , ecc. |

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| Laghi artificiali | CLC 5122 | In questa tipologia sono inclusi tutti i corpi idrici artificiali in cui la vegetazione può essere più o meno presente a seconda dell'utilizzo dello stesso. Seppur artificiali, questi laghetti possono presentare, in base alla profondità delle acque e della conformazione delle sponde, aspetti di notevole interesse e ospitare gli habitat 3130, 3140, 3150 e 3170. Sono presenti in tutta la ZSC. |
|-------------------|-------------|---|

3.2 - Gli habitat

Nel ZSC “*Cono vulcanico del Monte Amiata*” sono quindi presenti 9 habitat di interesse comunitario, di cui 7 inseriti anche nell’All. A1 della L.R. 56/2000; non risultano infatti ancora inseriti in questo allegato gli habitat di interesse comunitario di nuova descrizione per l’Italia (91M0) o non ancora segnalati per la Toscana (6410). Degli 8 habitat segnalati, solo 2 erano già presenti nel Formulario Natura 2000, mentre gli altri sono stati individuati a seguito delle indagini condotte per l’elaborazione del presente Piano.

Nel sito è segnalata anche una fitocenosi inserita tra gli elementi di attenzione del database regionale Re.Na.To. Le fitocenosi elencate in questo database sono elementi vegetazionali caratteristici di specifici ambiti geografici e particolarmente rappresentativi di un particolare habitat a livello regionale. Si tratta della fitocenosi denominata “Faggete di altitudine del Monte Amiata”, attribuibile all’habitat 9210 (habitat prioritario) e localizzata presso Pratolungo.

| Cod. | Re.Na.To. | Habitat | Dir. Habitat | LR 56/2000 | Area (ha) e % |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|-------------------|
| 3130 | H091 | Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea <i>Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea</i> | I | A | 0.23 0.01% (2) |
| 6410 | - | Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) - | I | - | 0.18 0.01% (2) |
| 6430 | H079 | Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile <i>Consorzi di alte erbe (megafornie) di radure e bordi dei boschi da planiziali a subalpini</i> | I | A | (3) |
| 6510 | H080 | Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) <i>Praterie magre da fieno a bassa altitudine</i> | I | A | 21.41 1.21% |
| 8110 | H036 | Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani) <i>Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli del piano alpino, subalpino e montano con formazioni di erbe perenni su substrato siliceo</i> | I | A | 0.12 0.01% |
| 91M0 | - | Foreste pannonicobalcaniche di cerro e rovere - | I | - | 35.20 1.99% |
| 92A0 | H089 | Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba <i>Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o Populus nigra</i> | I | A | 1.19 0.07% |
| 9210* (1) | H085 | Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex <i>Boschi a dominanza di faggio e/o querce degli Appennini con Ilex e Taxus</i> | I | A | 885.86 50.13% |
| 9260 (1) | H088 | Boschi di Castanea sativa <i>Boschi a dominanza di castagno</i> | I | A | 458.67 25.95% |

Tab. 2 - Habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario (in grassetto) e regionale (in corsivo) segnalati per la ZSC Cono vulcanico del Monte Amiata, inclusi rispettivamente nell'Allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e/o nell'Allegato A1 della L.R. 56/2000. Viene riportato il codice Natura 2000 (Cod.), seguito dall'asterisco in caso di habitat prioritario, e il codice dell'habitat utilizzato nel database Re.Na.To. Nei casi in cui un habitat non è incluso nell'Allegato A1 della L.R. 56/2000, viene riportato in corsivo il nome dell'habitat in Re.Na.To. quando presente. Nell'ultima colonna è riportata la superficie dell'habitat in ettari e la sua percentuale nel sito. La lista è limitata agli habitat segnalati nella parte del sito ricadente in provincia di Siena, oggetto di questo Piano di Gestione.

(1) Habitat presente nel Formulario Natura 2000;

(2) Habitat cartografato a mosaico con uno o più altri habitat (la superficie riportata è quella complessiva);

(3) Habitat non cartografabile a causa delle ridotte dimensioni.

3.3 - La flora

Nelle Tabelle 3 e 4 sono riportate le specie floristiche di interesse conservazionistico individuate. Si tratta complessivamente di 70 specie, di cui 32 inserite in normative specifiche o liste di attenzione (tabella 3) e 32 di interesse fitogeografico (tabella 4).

E' da evidenziare l'importanza della ZSC per la famiglia delle Orchidacee, presenti in tutto con 46 specie. Per questo gruppo floristico il Monte Amiata rappresenta un hot-spot, in quanto vi sono segnalate gran parte delle 56 specie di Orchidacee individuate per il territorio provinciale.

| Specie | Nome comune | Dir. 92/43/CEE | L.R. 56/2000 | Lista Rossa EU27 | Lista Rossa Italia | Re.Na.To. |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| <i>Abies alba</i> | Abete bianco | - | A | - | - | - |
| <i>Anemone appennina</i> (1) | Anemone appenninica | - | A | - | - | - |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Aquilegia comune | - | A-C | - | - | - |
| <i>Asarum europaeum</i> (= <i>A. europaeum</i> subsp. <i>italicum</i>) (1) | Baccaro comune | - | A | - | - | - |
| <i>Asphodelus ramosus</i> subsp. <i>ramosus</i> (= <i>A. microcarpus</i>) | Asfodelo montano | - | A | - | - | - |
| <i>Atropa belladonna</i> | Belladonna | - | A | - | - | - |
| <i>Corallorhiza trifida</i> | Orchidea corallo | - | A | LC | - | - |
| <i>Corydalis pumila</i> (1) | Colombina minore | - | A | - | - | - |
| <i>Dactylorhiza romana</i> (= <i>Dactylorhiza sulphurea</i> subsp. <i>pseudosambucina</i> ; <i>Orchis romana</i>) (1) | Orchidea romana | - | A | LC | - | - |
| <i>Digitalis lutea</i> subsp. <i>australis</i> (= <i>Digitalis micrantha</i>) | Digitale appenninica | - | A | - | - | - |
| <i>Epilobium roseum</i> subsp. <i>roseum</i> (1) | Garofanino roseo | - | A | - | - | VU |
| <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>latina</i> (1) | Elleborina del Lazio | - | A | LC | - | - |
| <i>Epipactis muellerii</i> (1) | Elleborine di Mueller | - | A | LC | - | - |
| <i>Epipactis persica</i> subsp. <i>gracilis</i> (1)(2) | Elleborine della Persia | - | A | - | - | - |
| <i>Epipactis persica</i> subsp. <i>pontica</i> (= <i>E. pontica</i>) (1) (2) | Elleborine della Persia | - | A | VU | - | VU |
| <i>Epipactis placentina</i> (= <i>E. muelleri</i> subsp. <i>cerritae</i>) | Epipactis di Piacenza | - | - | EN | - | - |
| <i>Epipogium aphyllum</i> (1) | Epipogio | - | A | LC | - | VU |
| <i>Erythronium dens-canis</i> | Dente di cane | - | A | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----|---|---|---|
| <i>Filaginella uliginosa</i> subsp. <i>uliginosa</i> (= <i>Gnaphalium uliginosum</i> subsp. <i>uliginosum</i> var. <i>prostratum</i>) | Canapicchia palustre | - | A | - | - | - |
| <i>Galium palustre</i> s.l. | Caglio delle paludi allungato | - | A | - | - | - |
| <i>Hieracium rupiculum</i> (= <i>H. neorupicola</i>) (1) | Sperviere delle rupi | - | A | - | - | - |
| <i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>croceum</i> (1) | Giglio di S. Giovanni | - | A-C | - | - | - |
| <i>Lilium martagon</i> (1) | Giglio martagone | - | A-C | - | - | - |
| <i>Listera ovata</i> | Listera maggiore | - | A | - | - | - |
| <i>Lonicera nigra</i> (1) | Caprifoglio nero | - | A | - | - | - |

Tab. 3 - Specie floristiche di interesse conservazionistico segnalate per la ZSC Cono vulcanico del Monte Amiata inserite in normative di protezione (Direttiva 92/43/CEE, Legge regionale 56/2000), nella Lista Rossa Europea riferita al territorio dei 27 Stati membri, nella Lista Rossa nazionale e nel database regionale Re.Na.To. Per le normative di protezione vengono indicati gli allegati di riferimento, per le Liste Rosse e per Re.Na.To. viene indicato lo status.

(1) Specie presente nel Formulario Natura 2000; (2) Nel Formulario è segnalata *Epipactis persica*, senza specifica della sottospecie

| Specie | Nome comune | Lista Rossa EU27 | Lista Rossa Italia | Re.Na.To. | Motivazione |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|-----------|--|
| <i>Actaea spicata</i> | Barba di capra | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Angelica selvatica | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Arum maculatum</i> | Gigaro scuro | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Athyrium filix-foemina</i> | Felce femmina | | - | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Carex hirta</i> | Carice villosa | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Carex ovalis</i> | Carice piè di lepre | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Carex remota</i> | Carice ascellare | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Cephalanthera damasonium</i> | Cefalantera giallognola | LC | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Cephalanthera longifolia</i> | Cefalantera maggiore | LC | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Cephalanthera rubra</i> | Cefalantera rossa | LC | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Circaea lutetiana</i> subsp. <i>lutetiana</i> | Erba maga comune | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> | Orchidea maculata | LC | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>tetragonum</i> | Garofanino quadrellato | | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i> | Elleborine comune | LC | - | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Epipactis microphylla</i> | Elleborina minore | NT | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Epipactis placentina</i> (= <i>E. muelleri</i> subsp. <i>cerritae</i>) | Epipactis di Piacenza | EN | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Euonymus latifolius</i> | Fusaggine maggiore | | - | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |

| | | | | |
|---|-------------------------------|----|----|---|
| <i>Galeopsis speciosa</i> | Canapetta screziata | | | Specie al limite dell'areale |
| <i>Geranium nodosum</i> | Geranio nodoso | | - | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Hypericum montanum</i> | Iperico montano | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Lythrum portula</i> (= <i>Peplis portula</i>) | Salcerella erba-portula | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>florentina</i> (1) | Nontiscordardimè fiorentino | | - | Specie endemica |
| <i>Neotinea tridentata</i> (= <i>Orchis tridentata</i> Scop.) | Orchidea screziata | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Neotinea ustulata</i> (= <i>Orchis ustulata</i>) | Orchidea bruciacchiata | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Neottia nidus-avis</i> | Nido d'uccello | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria. |
| <i>Ophrys apifera</i> | Fior di vespa | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Ophrys fusca</i> | Ofride scura | LC | - | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Ophrys incubacea</i> | Fior ragno scuro | | - | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Orchis anthropophora</i> (= <i>Aceras anthropophorum</i>) | Omini | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Orchis mascula</i> | Orchidea maschio | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Orchis provincialis</i> | Orchidea gialla | LC | LC | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Orchis simia</i> | Orchidea scimmia | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Orobanche rapum-genistae</i> subsp. <i>rapum-genistae</i> | Succiamele maggiore | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Phyteuma scorzonerifolium</i> | Raponzolo a foglie scorzonera | di | - | Specie rara o a distribuzione frammentaria. |
| <i>Platanthera bifolia</i> | Platantera comune | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Salix cinerea</i> | Salice cinereo | | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Serapias lingua</i> | Serapide lingua | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Veronica beccabunga | LC | | Specie rara o a distribuzione frammentaria |

Tab. 4 - Specie floristiche di interesse fitogeografico segnalate per la ZSC "Cono vulcanico del Monte Amiata"
(1) Specie presente nel Formulario Natura 2000

3.4 - La fauna

Il quadro conoscitivo sulla fauna è stato redatto raccogliendo i dati provenienti dalla bibliografia esistente e da indagini di approfondimento svolte appositamente per la redazione del Piano di Gestione (NEMO, 2013; Piazzini, 2013a). Di seguito saranno elencati i diversi gruppi di animali con il relativo numero di specie d'interesse conservazionistico:

- Invertebrati : risultano quindi presenti nella ZSC, relativamente alla parte senese, 16 specie di invertebrati di interesse conservazionistico di cui 6 specie di Molluschi e 10 specie di Insetti;

- Anfibi: le specie di interesse conservazionistico segnalate per il sito sono comunque 6, di cui 4 contenute nel Formulario Natura 2000. Per gli Anfibi del sito è disponibile la mappatura, aggiornata al 2013 e integrata dagli studi realizzati per il presente Piano, dei siti riproduttivi, eseguita per la redazione dell'Atlante provinciale degli Anfibi;
- Rettili: le specie di interesse conservazionistico nel sito sono quindi 41, di cui 14 di interesse comunitario (All. I della Dir. 2009/147/CE e specie migratrici di cui all'art. 4 comma 2 della Direttiva) e 8 di interesse regionale (All. A2 della L.R. 56/2000);
- Uccelli: nella ZSC sono presenti 52 specie di Uccelli di interesse conservazionistico. In particolare, le specie di interesse comunitario (All. I della Direttiva Uccelli) sono 7, cui si aggiungono altre 5 specie migratrici di cui all'art. 4 comma 2 della Direttiva. Le specie di interesse regionale (All. A2 della L.R. 56/2000) sono complessivamente 10, e molte sono le specie contenute nella Lista Rossa nazionale, considerate con stato sfavorevole a livello europeo e/o presenti tra le liste di attenzione di Re.Na.To.;
- Mammiferi: le specie di mammiferi di interesse conservazionistico rilevate all'interno della ZSC sono complessivamente 35, delle quali 6 di interesse comunitario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE) e 20 di interesse regionale (Allegato A1 della L.R. 56/2000); solo 3 specie sono contenute nel Formulario Natura 2000.

3.5 - Principali elementi di criticità del sito

Con la D.G.R. 644/2004, la Regione Toscana ha individuato le criticità e definito i principali obiettivi di conservazione di ciascun Sito, indicando le principali misure di conservazione necessarie per il loro raggiungimento, al fine di costituire un quadro di riferimento organico per l'intera rete regionale di siti e di evidenziare le specificità e l'apporto di ciascun Sito alla rete stessa. La scheda relativa alla ZSC "*Cono vulcanico del Monte Amiata*" contenuta in tale documento costituisce quindi un importante riferimento per l'elaborazione del Piano di Gestione, tenendo conto delle necessità di un suo aggiornamento rispetto al contesto attuale e alle informazioni raccolte in sede di Quadro Conoscitivo.

L'analisi dei contenuti della D.G.R. 644/2004 fornisce un primo quadro sulle principali cause di criticità interne e esterne ai siti.

La D.G.R. 644/2004 individua infatti i seguenti elementi di criticità interni al sito:

- Pratiche selvicolturali che inducono un abbassamento dei livelli di naturalità.
- Presenza, sino alla vetta, di impianti turistici (soprattutto sciistici) e della relativa viabilità; ne conseguono elevati carichi turistici invernali ed estivi, l'antropizzazione e la frammentazione degli habitat, il disturbo alla fauna, l'inquinamento delle acque, la diffusione di piante appartenenti a specie o ecotipi non locali, con rischio di inquinamento genetico, e l'innescò di fenomeni erosivi.

E le seguenti per quanto riguarda le criticità esterne:

- Centri abitati e zone antropizzate ai limiti del sito.

La macrocategoria "B - Selvicoltura", è quella che è intaccata dalle operazioni richieste all'interno dell'area ZSC. Nello specifico, tale macrocategoria prescrive:

| Categoria UE | Descrizione delle criticità specifiche per il sito | Habitat e/o specie di interesse comunitario e regionale interessate | Dove | Pressione/Minaccia |
|--------------|---|--|--|--------------------|
| | Utilizzazione forestale di qualsiasi genere | FLORA: <i>Abies alba</i> | Abetina del Vivo | M |
| B02 | Ceduo matricinato | Habitat 91M0, 9260 Specie vegetali forestali nemorali: <i>Anemone apennina</i> , <i>Aquilegia vulgaris</i> , <i>Epipactis muelleri</i> , <i>Listera ovata</i> Specie vegetali forestali sciafile: <i>Corallorhiza trifida</i> , <i>Epipactis helleborine latina</i> , <i>Epipactis persica subsp. gracilis</i> , <i>Epipactis persica subsp. pontica</i> , <i>Epipogium aphyllum</i> , <i>Erythronium dens-canis</i> , <i>Lonicera nigra</i> Invertebrati forestali: <i>Arion intermedius</i> , <i>Balea perversa</i> , <i>Semilimacella bonellii</i> , <i>Retinella olivetorum</i> , <i>Calosoma sycophanta</i> , <i>Lucanus cervus</i> , <i>Sinodendron cylindricum</i> Specie faunistiche legate a lettiera ricca di invertebrati e a boschi a struttura complessa: <i>Rana italica</i> , <i>Salamandrina perspicillata</i> Specie faunistiche legate alla presenza di habitat forestali strutturati e/o alla presenza di grossi alberi: <i>Elaphe quatuorlineata</i> , <i>Accipiter nisus</i> , <i>Buteo buteo</i> , <i>Circaetus gallicus</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Turdus viscivorus</i> , <i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Felis silvestris</i> , <i>Martes martes</i> , <i>Muscardinus avellanarius</i> , <i>Mustela putorius</i> , <i>Myotis myotis</i> , <i>Nyctalus leisleri</i> , <i>Nyctalus noctula</i> , <i>Pipistrellus nathusii</i> , <i>Pipistrellus pipistrellus</i> , <i>Pipistrellus pygmaeus</i> , <i>Plecotus auritus/austriacus</i> , <i>Rhinolophus euryale</i> , <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> ALTRE SPECIE: <i>Vitrinobrachium breve</i> , <i>Clausilia cruciata amiatiae</i> , <i>Percus paykulli</i> , <i>Zamenis longissimus</i> , <i>Parus palustris</i> <i>Pyrrhula pyrrhula</i>) | Tutti i boschi governati a ceduo del sito | P |
| B02 | Gestione selvicolturale delle fustaie che tende a semplificare la struttura (fustaia con tagli successivi uniformi) | Habitat : 9210* | Tutte le faggete gestite a fustaia con tagli successivi uniformi | P |
| B02 | Taglio della vegetazione lungo reticolo idrografico maggiore e minore | Habitat:: 92A0, 6430 Invertebrati degli ambienti ripari e umidi: <i>Zerynthia polixena</i> , <i>Euplagia quadripunctaria</i> e Anfibi che si riproducono in corsi d'acqua: <i>Rana italica</i> , <i>Salamandrina perspicillata</i> , <i>Triturus carnifex</i> | Tutta la vegetazione forestale lungo il reticolo idraulico (in particolare Torrente Vivo, Fosso Vessola/Lagaccione, Fosso Canaletto) | P |
| | | ALTRE SPECIE <i>Triturus vulgaris</i> , <i>Bufo bufo</i> , <i>Rane verdi</i> , <i>Natrix natrix</i> . | | |
| B02.04 | Rimozione di alberi morti e deperienti | Invertebrati legati al legno morto per lo sviluppo delle larve: <i>Calosoma sycophanta</i> , <i>Lucanus cervus</i> , <i>Sinodendron cylindricum</i> Anfibi e rettili che utilizzano rifugi in grandi alberi e nel legno morto: <i>Salamandrina perspicillata</i> , <i>Rana italica</i> , <i>Elaphe quatuorlineata</i> Uccelli che nidificano in vecchi alberi: <i>Accipiter nisus</i> , <i>Buteo buteo</i> , <i>Pernis apivorus</i> Mammiferi che stabiliscono colonie riproduttive/svernanti in vecchi alberi: <i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Muscardinus avellanarius</i> , <i>Nyctalus leisleri</i> , <i>Nyctalus noctula</i> , <i>Pipistrellus nathusii</i> , <i>Pipistrellus pygmaeus</i> , <i>Plecotus sp</i> , <i>Rhinolophus Euryale</i> , <i>Rhinolophus hipposideros</i> | Tutti gli ambienti forestali | P |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | ALTRE SPECIE <i>Parus palustris</i> | | |
| B07 | Abbandono colturale dei castagneti da frutto | Habitat 9260 Uccelli che nidificano su grandi alberi (su rami o cavità): <i>Accipiter nisus, Buteo buteo, Pernis apivorus, Turdus viscivorus, Phoenicurus phoenicurus</i> Mammiferi che si riproducono o si rifugiano in cavità degli alberi: <i>Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus sp. (auritus), Rhinolophus Euryale, Rhinolophus hipposideros</i> ALTRE SPECIE <i>Parus palustris</i> | Residue formazioni presenti a sud di Vivo d'Orcia e presso Fonte Sambuco | P |
| B07 | Esbosco | Habitat: 3130, 6410, 91M0, 9210*, 9260, 92A0 Specie nemorali: <i>Listera ovata</i> e altre geofite e specie con stazioni puntiformi | Tutti i boschi del sito ed in particolare le aree evidenziate nella Carta delle aree di rilevante interesse floro-faunistico | P |

Tab. 5 - Schema delle criticità (pressioni e minacce) individuate per il sito e classificate secondo la codifica dell'Agenzia Europea per l'Ambiente. Sono riportate le criticità per habitat e specie di interesse comunitario e, come "Altre specie", le altre specie di particolare interesse conservazionistico per il sito. Nell'ultima colonna è riportato il tipo di criticità, specificando se si tratta di una pressione (P) o di una minaccia (M)

Mettendo in correlazione tutte le macrocategorie in base alle ricorrenze complessive, si noterà quanto segue:




Fig. 1 - Ripartizione delle criticità per gli habitat in macrocategorie sulla base delle ricorrenze complessive

Come è logico attendersi in un sito quasi completamente boscato, la macrocategoria che ha i maggiori impatti sia sugli habitat che sulle specie è quella relativa alla “Selvicoltura” (“B”).

Le macrocategorie che seguono per importanza, anche se con un notevole distacco, sono quelle afferenti alla “Modifica dei sistemi naturali” (J), comprendente principalmente le alterazioni a carico dei corsi d'acqua e in misura minore gli incendi, e alle “Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico” (I), per quanto riguarda gli habitat; per le specie, invece, seguono le macrocategorie “Agricoltura” (A) e “Modifiche dei sistemi naturali” (J), comprendente anche in questo caso, le alterazioni a carico dei corsi d'acqua ma, in misura non trascurabile, anche la distruzione degli elementi di diversità del paesaggio agro-forestale.

Per quanto riguarda gli ambienti forestali, le due criticità principali derivano per le specie dalle elevate superfici sottoposte a ceduo matricinato e, per gli habitat, dalle pratiche di esbosco. Si tratta comunque di criticità localizzate, rispetto ad una complessiva gestione forestale che viene attuata in gran parte nel rispetto dei valori naturalistici presenti, soprattutto per quanto riguarda le faggete (governate a fustaia), i residui castagneti da frutto, alcune fustaie di castagno e alcuni cedui di castagno con turno lungo presenti nella proprietà demaniale.

La diffusione della ceduazione su vasta scala (B02-Ceduazione, 49% delle specie interessate e 25% degli habitat) ed in particolare del ceduo matricinato come principale scelta di governo, colpisce infatti i castagneti (habitat 9260) a turno breve, utilizzati per la produzione di paleria. Questa forma di gestione comporta, per una certa parte della fascia climatica inferiore del sito, una eccessiva semplificazione dell'ecosistema forestale, rendendolo inadeguato per specie che necessitano di boschi strutturati o vetusti, quali, per prime, le specie vegetali nemorali e quelle sciafile (ad esempio tutte le orchidee forestali) e poi gli invertebrati forestali tipici dei boschi maturi (*Lucanus cervus*, *Calosoma sycopantha*, *Synodendron cylindricum* e i vari molluschi forestali); la povertà della lettiera in termini di invertebrati si riflette sulle specie che se ne cibano come la salamandrina di Savi (*Salamandrina perspicillata*) e la rana appenninica (*Rana italica*). L'impatto che sembra essere maggiore, in termini di specie coinvolte, riguarda tutti quegli uccelli e quei mammiferi che necessitano di grandi alberi per il rifugio o la riproduzione, oltre che di ambienti complessi e ricchi di cibo: ne risultano coinvolti infatti ben 11 specie di chiroteri, gruppo faunistico per il quale l'Amiata presenta forti potenzialità, con specie rare o assenti nel resto del territorio, e diverse specie di uccelli che hanno sull'Amiata le uniche segnalazioni della Toscana meridionale, come l'astore e il ciuffolotto. In definitiva quindi l'utilizzo ceduo dei castagneti limita fortemente le possibilità di insediamento di queste specie nella fascia climatica più favorevole del sito.

Sempre per quanto riguarda le forme di governo, una criticità che colpisce un solo habitat ma una grande superficie del sito è quello della gestione, talvolta eccessivamente uniforme, delle fustaie di faggio (habitat 9210*) (B02 – Gestione a fustaia uniforme), nelle quali viene prevalentemente praticato il trattamento a tagli successivi uniformi, che ha portato talvolta a boschi coetanei e poco diversificati in termini di struttura e composizione; tale criticità è comunque bassa e in gran parte compensata dalle grandi superfici di habitat presenti, oltre che da alcune aree destinate a conservazione in località Cantinacce, ma limita

le potenzialità dell'habitat nel sito anche in quelle stazioni di presenza dell'abete bianco (*Abies alba*), che risente degli utilizzi forestali in genere.

Legata alla ceduzione ma, anche se in minor misura, ai boschi governati a fustaia, è un'altra minaccia importante per le specie, e cioè quella della scarsità e rimozione di alberi morti o deperienti (B02.04; 21% delle specie), che colpisce anche in questo caso e per gli stessi motivi evidenziati per la ceduzione, gli invertebrati forestali, gli anfibi e alcuni chiroterti e uccelli.

Per tutte le forme di governo, l'esbosco (B07-Esbosco) è risultato tra le criticità più importanti per gli habitat, attività che può divenire piuttosto impattante se non correttamente attuato e adattato in base al contesto spesso delicato del sito. Pratiche di esbosco non adeguatamente pianificate possono portare alla distruzione della lettiera e avere ripercussioni sui popolamenti di geofite e di altre specie floristiche rare presenti nelle faggeta e nei castagneti, in particolare nelle aree di rilevante interesse floro-faunistico evidenziate nella tavola 3A. L'esbosco può avere ripercussioni forti anche sugli ambienti umidi riferibili agli habitat 3130, 6410 e 6430 per i delicati equilibri idrologici che li caratterizzano, come nel caso di Pian della Piscina.

Una criticità minore per gli ambienti forestali del sito, anche se localmente importante, è quella data dai tagli lungo il reticolo idraulico maggiore e minore (B02-Tagli forestali lungo il reticolo idraulico, 6% delle specie e 25% degli habitat), intendendo con questi sia i tagli effettuati sulla vegetazione a salici, pioppi e ontani (habitat 92A0) sia quelli che interessano il reticolo idraulico minore durante le normali operazioni selvicolturali eseguite senza lasciare adeguate fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. Per quanto riguarda l'habitat 92A0, la criticità è molto bassa, per lo scarso interesse economico di questa formazione nel sito, limitata a due affluenti del torrente Vivo alle quote più basse del sito. Tuttavia, qui come nel resto del reticolo idraulico il taglio, ed in particolare la ceduzione, può avere impatti negativi pesanti lungo il torrente Vivo e i suoi affluenti (fosso Canaletto e fosso Vessola/Lagaccione) compromettendo le aree umide marginali, che rivestono un elevato interesse floristico (habitat 6430 e stazioni di specie rare), oltre che gli ambienti di vita tipici di anfibi (*Rana italica*, *Salamandrina perspicillata*, *Triturus carnifex*) e invertebrati di interesse conservazionistico (*Zerynthia polixena*, *Euplagia quadripunctaria*).

Ancora per gli ambienti forestali, l'abbandono colturale dei castagneti da frutto (B07) può costituire una criticità sia in termini paesaggistici che di perdita di nicchie ecologiche (grandi alberi ricchi in cavità) per le specie di interesse, anche se nel versante senese il fenomeno è poco presente ed in parte collegabile anche alla presenza di specie patogene (I01) come il cinipide del castagno. Per gli habitat forestali viene segnalata anche la problematica del carico eccessivo di ungulati selvatici (F03.01.01) ed in particolare del cinghiale, con problemi alla rinnovazione forestale, tuttavia ridimensionati rispetto ad altri siti del senese, per la presenza della gestione a fustaia in gran parte del sito. La criticità è invece più forte per i popolamenti di geofite forestali e anche per quelle degli ambienti di prateria. E' inoltre segnalata anche per l'habitat 8110, sugli affioramenti rocciosi della vetta, dove ne può risentire soprattutto *Sedum alpestre*. La presenza e/o la possibile ulteriore diffusione di specie alloctone vegetali (I01), che interessa la metà degli habitat (vale a dire tutti quelli forestali) è da considerare come una minaccia futura e non come una

pressione attualmente presente. Infatti nel sito non sono state segnalate ad oggi specie alloctone problematiche come la robinia o l'ailanto, che tuttavia potrebbero in futuro comparire se non vengono attuate precauzioni per evitarne la diffusione, in particolare per quanto riguarda i boschi lungo i corsi d'acqua.

3.6 - Principali misure di conservazione

Per la ZSC “*Cono vulcanico del Monte Amiata*”, la D.G.R. 644/2004 stabilisce i seguenti “Principali obiettivi di conservazione”, tra parentesi il relativo livello di importanza (EE = molto elevata; E = elevata; M = media; B = bassa), che tiene conto dell'importanza a scala regionale delle specie e degli habitat interessati dalla misura, che della necessità e dell'urgenza di attuazione)

- Coordinamento della pianificazione forestale, nell'intero sito, e suo adeguamento rispetto agli obiettivi di conservazione, in modo da garantire il mantenimento dei boschi di alto fusto e dei castagneti da frutto, l'incremento della maturità dei soprassuoli nelle stazioni più adatte e la tutela delle fasi mature e senescenti, salvaguardando gli alberi di grosse dimensioni e marcescenti (E).
- Controllo dell'impatto causato dalle infrastrutture e dalle attività sciistiche e turistiche, in generale, relativamente a eventuali ipotesi di sviluppo e agli interventi di ripristino ambientale (scelta di specie ed ecotipi da utilizzare, per opere di inerbimento delle piste e delle scarpate, ecc.) (E).
- Misure gestionali o normative per garantire la conservazione e la gestione adeguata delle scarsissime zone aperte (M).

Nella scelta e nella predisposizione delle azioni, infine, è stato tenuto particolarmente conto dell'importanza che il settore agricolo e forestale hanno per l'economia del sito.

L'elevato tasso di boscosità del sito unito al generale livello di maturità dei soprassuoli non impongono l'adozione di misure selvicolturali diverse da quelle esistenti, se non per alcune aree del sito dove si concentrano le aree più estese dei castagneti cedui. Più urgenti sono l'attuazione di misure volte a contrastare la perdita delle poche aree aperte presenti e la predisposizione e l'attuazione di monitoraggi faunistici approfonditi, data la sostanziale carenza di informazioni, per un sito che anche ha un enorme valore biogeografico

Nella tabella sottostante si riportano gli obiettivi specifici e le azioni elaborati sulla base delle minacce/pressioni riscontrate per il sito.

Per la realizzazione degli interventi previsti, l'azione di tutela cui si deve fare riferimento, nello specifico, è l'Azione 2 “*Indirizzi per la gestione forestale nelle proprietà private*” e Azione 12 “*Controllo del disturbo e del degrado dovuto all'antropizzazione del sito*”, di seguito riportata:

| Obiettivo specifico | Azioni e priorità |
|--|--|
| OS1_Conservazione della matrice forestale e incremento della caratterizzazione ecologica e della maturità delle compagini boschive. | AZIONE 1 - Indirizzi per la pianificazione e la gestione delle superfici forestali comprese nel demanio regionale. AZIONE 2 – Indirizzi per la gestione forestale nelle proprietà private. AZIONE 3 - Indirizzi generali per l'aumento della biodiversità strutturale degli habitat forestali e per l'applicazione di pratiche di utilizzo forestale coerenti con le necessità di tutela. AZIONE 4 - Regolamentazione delle pratiche di esbosco. AZIONE 5 - Prevenzione e riduzione del rischio incendi. |
| OS2_ Valorizzazione del ruolo dell'agricoltura per la conservazione del sito e recupero delle aree aperte. | AZIONE 6 – Indirizzi per le aree agricole in terreni privati. |
| OS3_ Conservazione degli aspetti di maggiore naturalità e biodiversità del sito e mantenimento dell'eterogeneità ambientale. | AZIONE 7 – Regolamentazione delle aree a conservazione. AZIONE 8 - Regolamentazione delle concessioni ed autorizzazioni all'attingimento idrico. AZIONE 9 - Conservazione e recupero degli elementi di diversità del paesaggio agroforestale e dei siti riproduttivi degli anfibi. |
| OS4_Riduzione dell'impatto sulla fauna degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei manufatti in genere. | AZIONE 10 - Indirizzi per interventi negli edifici. |
| OS5_Controllo dell'impatto antropico, riducendo al minimo possibile gli eventuali ulteriori incrementi delle strutture e della viabilità. | AZIONE 11 – Indirizzi per gli assi viari. AZIONE 12 - Controllo del disturbo e del degrado dovuto all'antropizzazione del sito. |
| OS6_Contenimento della diffusione di specie alloctone o problematiche. | AZIONE 13 - Prevenzione della diffusione di specie alloctone vegetali negli ambienti forestali. AZIONE 14 - Indirizzi per la pesca. AZIONE 15 – Indirizzi per la gestione faunistico venatoria. |
| OS7_Conservazione del lupo. | AZIONE N. 16 – Diminuzione del conflitto tra lupo e comunità locali. |
| OS8_Aumento della vigilanza. | AZIONE N.17 – Incremento delle attività di vigilanza e controllo nella ZSC |

3.7 – Caratteristiche ZSC “Cono vulcanico del Monte Amiata” - Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 11.08.2004

SITO DI IMPORTANZA REGIONALE (SIR)

Tipo sito

Anche ZSC

CARATTERISTICHE DEL SITO

Estensione: 6.144,75 ha

Presenza di area protetta: sito in parte compreso nell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) “Val d’Orcia”

Tipologia ambientale prevalente: rilievo montuoso quasi interamente coperto da boschi, con prevalenza di faggete e castagneti

Altre tipologie ambientali rilevanti: praterie secondarie

Principali emergenze

FITOCENOSI

Faggete di altitudine del Monte Amiata [*Monotrope-Fagetum sylvaticae* (Arrigoni et Nardi) Ubaldi].

SPECIE VEGETALI

(AII) *Jonopsidium savianum* (bivonea di Savi) – Rara specie presente in Toscana in alcune stazioni delle colline subcostiere livornesi e in una stazione alle pendici del M. Amiata.

Epipactis persica (elleborine della Persia) - Specie molto rara in Italia, nota in Toscana per due località del Monte Amiata.

SPECIE ANIMALI

(AII) *Elaphe quatuorlineata* (cervone, Rettili).

(AII) *Testudo hermanni* (testuggine di Hermann, Rettili).

(AI) *Circaetus gallicus* (biancone, Uccelli) – Probabilmente nidificante con più coppie.

Felis silvestris (gatto selvatico, Mammiferi) – Da confermare.

Altre emergenze

Paesaggio alto montano con matrice forestale continua

Principali elementi di criticità interni al sito

- Pratiche selvicolturali che inducono un abbassamento dei livelli di naturalità.
- Presenza, sino alla vetta, di impianti turistici (soprattutto sciistici) e della relativa viabilità; ne conseguono elevati carichi turistici invernali ed estivi, l'antropizzazione e la frammentazione degli habitat, il disturbo alla fauna, l'inquinamento delle acque, la diffusione di piante appartenenti a specie o ecotipi non locali, con rischio di inquinamento genetico, e l'innescio di fenomeni erosivi.

Principali elementi di criticità esterni al sito

- Centri abitati e zone antropizzate ai limiti del sito.

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE

Principali obiettivi di conservazione

- a) Conservazione della matrice forestale e incremento della caratterizzazione ecologica e della maturità delle compagini boschive (E).
- b) Controllo dell'antropizzazione, riducendo al minimo possibile gli eventuali ulteriori incrementi delle strutture turistiche e della viabilità (M).
- c) Tutela e gestione razionale delle scarsissime zone aperte, che costituiscono l'habitat di varie specie endemiche o minacciate (M).

Indicazioni per le misure di conservazione

- Coordinamento della pianificazione forestale, nell'intero sito, e suo adeguamento rispetto agli obiettivi di conservazione, in modo da garantire il mantenimento dei boschi di alto fusto e dei castagneti da frutto, l'incremento della maturità dei soprassuoli nelle stazioni più adatte e la tutela delle fasi mature e senescenti, salvaguardando gli alberi di grosse dimensioni e marcescenti (E).
- Controllo dell'impatto causato dalle infrastrutture e dalle attività sciistiche e turistiche, in generale, relativamente a eventuali ipotesi di sviluppo e agli interventi di ripristino ambientale (scelta di specie ed ecotipi da utilizzare, per opere di inerbimento delle piste e delle scarpate, ecc.) (E).
- Misure gestionali o normative per garantire la conservazione e la gestione adeguata delle scarsissime zone aperte (M).

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito: non necessario.

Necessità di piani di settore: necessario il coordinamento e la verifica, e l'eventuale adeguamento, della pianificazione forestale.

Note: –

4 - Interventi agroforestali per cui è richiesto lo Studio di Incidenza Ambientale

(Supplemento n. 114 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 16.11.2011 parte seconda / 916-11)

4.1 - 117 IT51A0017 Cono vulcanico del Monte Amiata

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 10 Querceti di Roverella <input type="checkbox"/> 11 Cerrete <input type="checkbox"/> 22 Faggete |
| -interventi di taglio ceduo, ad esclusione dei cedui a sterzo, se eccedenti i 5 ha accorpati |
| Motivazione: conservazione degli habitat |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 14 Castagneti |
| -nei castagneti da frutto il taglio delle piante da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive e la loro riconversione alla produzione legnosa di cui all'Art. 52 comma 6 del Regolamento Forestale |
| -interventi di taglio ceduo se eccedenti i 10 ha accorpati |
| Motivazione: conservazione degli habitat |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 18 Pinete di rimboschimento di Pino nero |
|---|

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> 19 Impianti di Douglasia <input type="checkbox"/> 23 Impianti di specie non spontanee di minore impiego (conifere) |
| -gli interventi di reimpianto di conifere e di Ontano napoletano (ad esclusione del reimpianto di douglasia) nel caso di tagli a raso con rinnovazione artificiale. |
| Motivazione: conservazione degli habitat |

5. Misure di conservazione

5.1 - Cono vulcanico del Monte Amiata - Misure di conservazione della ZSC (Supplemento n. 179 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 30.12.2015 / 1223-15)

| Tematiche | Misure conservazione |
|--|---|
| AGRICOLTURA, PASCOLO | <ul style="list-style-type: none"> - IA_A_01 - Individuazione e idonea protezione dei nidi di Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>), nelle aree di presunta nidificazione, prima delle operazioni di sfalcio; - IA_A_03 - Interventi di decespugliamento delle aree agricole abbandonate (così come definite ai sensi della lettera c del comma 5 dell'art. 3 della legge forestale) esistenti in habitat aperti a contatto con il bosco da realizzarsi salvaguardando le condizioni di ecotonalità e compenetrazione tra gli ambienti forestali e quelli aperti, attraverso il rilascio di piante isolate e fasce arbustate; - INC_A_04 - Incentivi al mantenimento o al recupero della aree agricole e pascolive classificabili come HNMF (Aree agricole ad alto valore naturale) così come previsto da PSR 2014-2020; - INC_A_06 - Promozione di azioni per la conservazione o il ripristino di siepi, filari, fossati, piccoli stagni, formazioni riparie, alberi camporili, muretti a secco e altri elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo; - INC_A_11 - Incentivi per i pascoli così come previsti dal PSR 2014-2020; - INC_A_12 - Promozione di azioni per la valorizzazione di prodotti biologici o a basso impatto ambientale; - RE_A_04 - Obbligo di impiego di tecniche di sfalcio poco invasive (barra d'involò o altro) in aree di accertata o presunta nidificazione di <i>Circus pygargus</i> e <i>Coturnix coturnix</i>. |
| CACCIA E PESCA | <ul style="list-style-type: none"> - IA_F_01 - Realizzazione di eventuali interventi di contenimento numerico della fauna ungulata, in base agli esiti del monitoraggio di cui alla misura MO_F_02; - MO_F_02 - Monitoraggio dei danni da ungulati sugli habitat e specie di interesse comunitario. |
| GESTIONE RISORSE IDRICHE CORSI D'ACQUA E DIFESA IDRAULICA | <ul style="list-style-type: none"> - IA_H_01 - Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento delle qualità delle acque e di eliminazione della cause di alterazione degli ecosistemi (Es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni, ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza: a) scarichi affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche |

| | |
|--|--|
| | <p>del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi;</p> <p>- MO_H_01 - Acquisizione, dagli enti competenti ai sensi del D. Lgs 152/2006 (Arpat), dei dati derivanti dal censimento e dal controllo degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, anche se esterni al Sito, ed afferenti ad habitat umidi del Sito tramite il reticolo idrografico;</p> <p>- MO_H_03 - Acquisizione, per l'espletamento delle attività di competenza dei diversi soggetti, dei dati relativi al monitoraggio dello stato di qualità ecologico e chimico degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, di cui all'allegato 1 alla parte III del D. Lgs. 152/2006. Ove questo sia ritenuto non adeguato alle necessità di tutela del sito il soggetto gestore del sito provvede a reperire gli ulteriori dati di monitoraggio, o studi, disponibili presso altri soggetti della P. A.;</p> <p>- RE_H_02 - Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte del D. Lgs. 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.</p> |
| <p>INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DI SPECIE E HABITAT</p> | <p>- IA_J_126 - Perimetrazione di dettaglio e gestione conservativa della fitocenosi "Faggete di altitudine del Monte Amiata (Monotrope-Fagetum sylvaticae (Arrigoni ed Nardi) Ubaldi)";</p> <p>- IA_J_17 - Realizzazione di interventi attivi di ripristino e contrasto dei fenomeni di inaridimento e/o interrimento di ambienti umidi, ritenuti necessari a seguito del monitoraggio di cui alla misura MO_J_04;</p> <p>- MO_J_04 - Monitoraggio dei fenomeni di interrimento e/o inaridimenti di ambienti umidi;</p> <p>- RE_U_22 - Verifica, da parte dell'Ente Gestore, della fattibilità di ampliamento della ZSC "Cono Vulcanico del Monte Amiata" a comprendere un tratto del torrente Vivo a valle di Vivo d'Orcia.</p> |
| <p>INFRASTRUTTURE</p> | <p>- IA_D_01 - Riduzione, nelle nuove opere e nuovi interventi di adeguamento stradale, dell'impatto della viabilità sulla fauna attraverso l'adozione di misure di mitigazione (sottopassi, dissuasori, ecc.) o di altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare nei tratti che intersecano corridoi ecologici;</p> <p>- IA_D_03 - Definizione e attuazione di un programma di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto sull'avifauna, delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe, in base agli esiti del monitoraggio;</p> <p>- MO_D_01 - Specifico programma di monitoraggio delle strade a grande percorrenza (Es. con traffico giornaliero medio superiore a 20.000) per identificare i tratti maggiormente interessati dagli impatti sulla fauna, per l'adozione dei possibili interventi;</p> <p>- MO_D_02 - Monitoraggio degli impatti dell'avifauna delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe interessate dagli spostamenti quotidiani degli uccelli;</p> <p>- RE_D_03 - Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.</p> |
| <p>SELVICOLTURA</p> | <p>- DI_B_01 - Promozione di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali;</p> <p>- IA_B_01 - Realizzazione di interventi di diradamento nelle aree critiche per presenza di rimboschimenti individuate dall'Ente Gestore;</p> |

- IA_B_09 - Habitat 9210 – favorire la disetaneizzazione e la diversità specifica effettuando localizzati diradamenti (prevalentemente dall'alto e selettivi) laddove sussistono possibilità concrete di ingresso spontaneo di altre specie (aceri, tigli, ecc.);

- IA_J_20 - Interventi selvicolturali finalizzati alla diversificazione specifica all'interno di formazioni pure di ceduo di castagno;

- IA_J_22 - Controllo dello stato fitosanitario dei boschi e realizzazione di eventuali interventi di soppressione delle fitopatologie;

- INC_B_01 - Incentivazione di interventi di diradamento su aree interessate da rimboschimenti;

- INC_B_02 - Incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree agricole abbandonate (così come definite ai sensi della lettera c del comma 5 dell'art. 3 della legge forestale) e delle radure esistenti all'interno del bosco;

- INC_B_03 - Incentivazione della "selvicoltura d'albero";

- INC_B_04 - Incentivazione, nel governo a ceduo, di rilascio di matricine secondo la normativa forestale di settore, con preferenza verso una matricinatura per livelli;

- INC_B_05 - Incentivi per promuovere una gestione forestale in grado di favorire l'aumento della biomassa vegetale morta e garantire una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti ad esclusione delle aree ad alto rischio di incendi e dei popolamenti costituiti da specie forestali ad alta infiammabilità o con problemi fitosanitari;

- MO_J_09 - Proseguimento e intensificazione dell'attività di monitoraggio dello stato fitosanitario delle foreste;

- RE_B_15 - Habitat 9210 – estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha, da applicarsi successivamente all'individuazione puntuale dell'habitat;

- RE_B_17 – Habitat 9260 – Estensione massima della singola tagliata nel governo a ceduo pari a 10 ha, da applicarsi successivamente all'individuazione puntuale dell'habitat;

- RE_B_20 - Nell'ambito delle attività selvicolturali di ceduzione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del regolamento forestale vigente, valutazione da parte del soggetto gestore:

- del mantenimento di almeno 2 piante/ha secche o deperienti o morte in piedi, escludendo quelle con criticità di tipo fitosanitario o le piante di specie pericolose per l'innescio di incendi boschivi, scelte tra quelle di dimensioni maggiori, e di 3 piante/ha a sviluppo indefinito che devono essere comprese nel numero di matricine previste in sede autorizzativa. Le piante stesse devono essere individuate e marcate sul tronco in sede di realizzazione del taglio.
- del rilascio, se presenti, almeno 2 piante/ha morte a terra, scelte tra quelle di dimensioni maggiori, equivalenti a circa 15 mc di necromassa per ciascun ettaro, comunque da rilasciare avendo cura di non creare barriere al deflusso delle acque, né cumuli pericolosi per l'innescio di incendi e di fitopatie.

- RE_B_27 - Realizzazione di un piano di azione (anche per Siti contigui) per la gestione di boschi a dominanza di castagno, attualmente o potenzialmente riconducibili all'habitat 9260;

- RE_B_33 - Divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico (così come individuato nella CTR e dalla DCR n. 57/2013 e s.m.i.) ad esclusione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico;


- RE_I_12 - Divieto di realizzare nuovi impianti con *Robinia pseudoacacia*, anche i sostituzioni di formazioni forestali preesistenti, ad eccezione dei casi in cui l'intervento riguardi zone

| | |
|--|---|
| | limitrofe all'interno del sito e soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico per la cui salvaguardia la Robinia sia l'unica scelta possibile. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento. |
|--|---|

6 - Descrizione dell'area e degli interventi


L'area interessata dall'intervento è situata in Loc. Prato della Contessa, nel Comune di Castel del Piano. L'ambiente è caratterizzato dalla presenza di faggete gestite all'alto fusto.

L'altitudine è di circa 1.400 m s.l.m. L'esposizione prevalente del terreno è N con pendenze appartenenti alla I° classe di pendenza (0-20%). Riguardo all'accidentalità del terreno questo risulta poco accidentato, ovvero con presenza di ostacoli su meno di 1/3 della superficie (sassi, massi, buche ecc.). Dal punto di vista geologico l'area è caratterizzata da una formazione di Bellaria: Duomo esogeno costituito da lave massive di composizione da trachitica a trachidacitica, di colore variabile da grigio a rosa fino al rosso deciso, fortemente porfiriche, con presenza di megacristalli di K-feldspato. Membro di Bellaria. L'ambiente fitoclimatico, secondo la classificazione Maver-Pavari, può ritenersi appartenente alla sottozona fredda del *Fagetum*. Il clima è sub-continentale, con precipitazioni annuali abbondanti e con temperature medie intorno ai 6-8° C.

L'intervento interesserà una piccola porzione delle particelle catastali  del Comune di Castel del Piano.

Descrizione dell'intervento

Oggetto dell'intervento è realizzazione di un'area ludica nella parte terminale della "Pista della Contessina" in dismissione.



Carta 1-2 – Individuazione puntuale dell’area dove verranno effettuati gli interventi

L’intervento prevedrà la realizzazione di alcune attrezzature (vedasi le planimetrie di progetto allegate) a scopo ludico, principalmente per bambini, creando un’area ludico in una zona dove attualmente non ci sono attrezzature con questa finalità. Nello specifico, verranno realizzati

un'area di giochi in legno, un labirinto anch'esso in legno, una giostra carosello e alcune piste tubing "Neveplast" che permetteranno di ricreare un ambiente simile al manto nevoso sul quale poter scivolare con apposita attrezzatura. Accanto alle piste, verrà realizzato un piccolo nastro trasportatore per i bob e le slitte da usare sulle piste stesse.

7 – Finalità ed obiettivi

Il Prato della Contessa è stato per molto tempo abbandonato e lasciato a sé stesso, a causa anche dell'abbandono della attività ricettive lì presenti. Tutto è nato dal calo del turismo legato a questo versante della montagna ma che ha colpito tutta la montagna in generale, soprattutto a causa della drastica riduzione della copertura nevosa nel periodo invernale. Da sempre, l'Amiata ha legato quasi la totalità della sua offerta ricettiva al solo periodo invernale e alle sole attività sciistiche, qui presenti ormai da decenni. La sempre più costante riduzione della neve sia in termini di quantità accumulata che soprattutto in termini di disponibilità per un periodo consono alla sua gestione e messa a disposizione per le attività di cui sopra, hanno portato a una drastica diminuzione del flusso turistico invernale, con conseguente abbandono di molte attività ricettive. Negli ultimi anni c'è stato un cambio di tendenza generale che ha portato ad un aumento dell'attenzione verso anche il periodo estivo, vedendo la nascita di alcune nuove attività legate non più allo sci e alla neve ma al biking, nordic walking e passeggiate nella natura. Sono quindi aumentati i turisti anche della stagione estiva e ciò comporta una necessità di aumento anche dell'offerta a cui possono accedere in questo periodo.

La progettazione in oggetto prevede appunto di aumentare le attività che l'Amiata potrà offrire d'estate, immergendo le persone nella natura con attività ludiche di basso impatto ma di ottima attrattiva.

Verranno utilizzati, per quanto possibile, materiali lignei o a basso impatto ambientale, tutti certificati secondo le normative vigenti. Non verranno effettuati tagli di piante né modifiche morfologiche del terreno visto che, per gli scivoli, è necessaria la pendenza del terreno che è già data dalla vecchia pista da sci sulla quale verranno poste le attrezzature. Non ci saranno pertanto modifiche ad habitat e aree di pregio.

Si prevede pertanto la realizzazione dell'intervento proposto senza la necessità di particolari prescrizioni di tutela ambientale.